


Lesní patra.

strana 34

Patro \_\_\_ **stromové** \_\_\_Patro \_\_\_ **keřové** \_\_\_Patro \_\_\_ **bylinné** \_\_\_Patro \_\_\_ **mechové** \_\_\_Patro \_\_\_ **kořenové** \_\_\_

Jednotlivá patra lesa se  
v průběhu roku **mění**.

Druhově nejbohatším  
typem lesa jsou lesy

\_\_\_ **lužní** \_\_\_.

- rozkladem rostlinných a živočišných zbytků působením bakterií vzniká \_\_\_ **humus** \_\_\_.

Živočichové v lesích

strana 36

Měkkýši

- měkké svalnaté tělo se nazývá \_\_\_ **noha** \_\_\_, na povrchu se vylučuje \_\_\_ **sliz** \_\_\_,
- na hlavě se nachází: kratší pár \_\_\_ **tykadel** \_\_\_, kde sídlí \_\_\_ **čich** \_\_\_,  
delší pár \_\_\_ **tykadel** \_\_\_, kde sídlí \_\_\_ **zrak** \_\_\_,  
ústa s drsným \_\_\_ **jazyčkem** \_\_\_, (**radula**)
- tělo je kryto vápenatou schránkou: \_\_\_ **štítem** \_\_\_ nebo \_\_\_ **ulitou** \_\_\_,
- po pravé straně pod schránkou najdeme \_\_\_ **dýchací** \_\_\_ otvor.

Dospělí měkkýši jsou \_\_\_ **obojetníci** \_\_\_ = **hermafrodité** - produkují samčí i samičí pohlavní buňky.

Zástupci: 1. **Slimák popelavý**



2. **Páskovka hajní**

